

お子様にお薬を 上手に飲ませるために

オセックス細粒小児用



このお薬は、イチゴ風味で、飲みやすい
お薬です。粉のまま少量のお水または
ぬるま湯で飲ませてください。

監修：川崎医科大学 小児科学講座 主任教授 尾内一信 先生



このお薬の飲ませ方

このお薬は、イチゴ風味で
飲みやすいお薬です。
少量の**水**または**ぬるま湯**
で飲ませてください！



どうしてもお水で飲めないお子様には

食べ物と混ぜて飲ませる

※アレルギーをお持ちの際は
ご注意ください。

以下のような食べ物に粉のまま、またはペースト状にして混ぜると
飲ませやすくなります。



プリン



イチゴジャム



りんごジュース



ピーナツクリーム



砂糖



ココアパウダー

小さなお子様に飲ませるときは

指先に薬をのせて飲ませる


- 1 きれいな指先にお薬を粉のまま、または1~2滴の水と混ぜペースト状にして、ほほの内側や上あごに塗ってください。



スポイトやスプーンで飲ませる

- 1 お薬に少量の水やぬるま湯を加えて混ぜます。

*たくさんの水で混ぜると、飲みきれないことがあるので注意してください。




- 2 スポイトやスプーンを使って、少しずつ飲ませます。

● スポイト

いっき
一気に飲ませると吐き出してしまうので、少しずつ飲ませます。

● スプーン

ひとくち
一口の量を少なくして、数回に分けて飲ませます。



Point!



お薬を飲ませたあとは、口の中のお薬を全部飲み込ませるために、水やぬるま湯を飲ませてください。

お薬を飲ませる時に知っておいてほしいこと




お薬を水や食べ物に混ぜて飲ませる場合は、作り置きせずに、飲ませる直前に混ぜてください。



赤ちゃん(乳児や離乳食を与えているお子様)の場合、ミルクやおかゆなど主食となる食べ物とお薬を混ぜるのは避けてください。

お薬のせいで、お子様が主食を嫌いになってしまうおそれがあります。



泣いている時にお薬を飲ませると、むせて吐き出してしまうことがあります。少し時間をおいて落ち着いてから、飲ませてください。



お薬がちゃんと飲めたら、お子様をほめてあげてください。

