

# 1日投与量早見表

監修

国立がん研究センター中央病院 感染症部長  
慶應義塾大学医学部 客員教授  
岩田 敏 先生



ニューキノロン系経口抗菌製剤

処方箋医薬品<sup>®</sup> 薬備基準収載

## オゼックス<sup>®</sup> 細粒小児用 15%

トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒

ニューキノロン系経口抗菌製剤





処方箋医薬品<sup>®</sup> 薬備基準収載

## オゼックス<sup>®</sup> 錠小児用 60mg

日本薬局方 トスフロキサシントシル酸塩錠

(注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

# オゼックス小児用製剤 1日投与量早見表

体重 (kg)	1日投与量(分2)	
	オゼックス細粒小児用15%(g)	オゼックス錠小児用60mg(錠)
6	0.5	
7	0.6	
8	0.6	
9	0.7	
10	0.8	
11	0.9	
12	1.0	
13	1.0	
14	1.1	
15	1.2	1.5錠×2回 
16	1.3	
17	1.4	
18	1.4	
19	1.5	
20	1.6	2錠×2回 
21	1.7	
22	1.8	
23	1.8	
24	1.9	
25	2.0	2.5錠×2回 
26	2.1	
27	2.2	
28	2.2	
29	2.3	
30~	2.4	3錠×2回 

オゼックス細粒小児用15%の1日投与量は次の式で計算できます。

$$\text{1日投与量 (g)} = \frac{12\text{mg/kg} \times \text{体重 (kg)}}{150}$$

## 【用法及び用量】

通常、小児に対してはトスフロキサントシル酸塩水和物として1回6mg/kg(トスフロキサシンとして4.1mg/kg)を1日2回経口投与する。ただし、1回180mg、1日360mg(トスフロキサシンとして1回122.4mg、1日244.8mg)を超えないこととする。

製品の詳細については添付文書をご参照ください。